

Kon bo por rekonosé un hende ku a usa ecstasy?

Un hende ku ta usa ecstasy por tin e siguiente síntomanan:

- E persona ta relahá i e no ta muestra preokupashon,
- E persona tin gana di aserká otro hende físicamente
- E persona ta yen di energia, hopi aktivo, sinti euforia i ta papia hopi
- Pupila di wowo ta grandi
- Ke baila i por keda baila durante hopi ora



Un kantidat di uso haltu di ecstasy por kousa:

- Halusinashon
- Desorientashon
- Miedu/Angustia

**Pa traha un sita òf pa risibí informashon,
bo por yama òf pasa na nos edifisio.
Fundashon pa Maneho di Adikshon**

Oosterbeekstraat 11, Sherasil / T: 461-5977 òf 670-5544 

W: www.fma-curacao.com / **E:** info@fma-curacao.com

Pa mas informashon tokante droga
i adikshon, bo por bishitá nos wèpsait.



Kiko ta ecstasy?

Ecstasy (XTC) ta un píldora òf puru manera kristal ku ta kontené e droga 3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA). MDMA ta nòmber kímiko pa e substansia aktivo di ecstasy i e ta pertenesé na e grupo di droga: anfetamina, ku ta un droga stimulante. E ta subi e aktividat kímiko den e seleber.

Nan ta yama MDMA; "M" òf Molly anto ecstasy: XTC òf X.

Píldoranan di ecstasy tin diferente koló i hopi biaha nan tin un logo òf un pintura riba dje. Hopi biaha ecstasy ta wòrdu usá na fiesta, p'esei e ta konosí komo un *partydrug*.

Kon ecstasy ta wòrdu usá?

E píldora, puru di MDMA i kristal ta wòrdu usá di forma oral, ku mayoria biaha un slòk di bibida su tras. Tin hende ku ta lemb'é. Ecstasy ta pasa den bo stoma i via di bo tripa e ta drenta den bo sanger. Ora e yega na bo seleber, bo ta sinti ku bo ta bou di influensha. Bo ta sinti su efekto entre mei ora i un ora. Ora bo usa e puru e efekto ta yega mas lihé. Despues di 4 ora su efekto ta baha i e ora ei bo ta sinti bo *down*. E persona ta sinti'é kansá, deprimí i sin ánimo.

Kiko ta e efektonan mental di ecstasy?

MDMA (ecstasy) ta stimulá e produkshon di sierto supstansia den bo seleber. Dor di esaki bo ta sinti kambio den e estado di konsiensia i tambe bo ta sinti un efekto eufórikó. Dor ecstasy bo ta haña hopi energia i un sintimentu di felisidat. Ademas e ta kousa un efekto ku bo ta haña mas nesensidat di tin kontakto ku otro hende. Bou di efekto di ecstasy bo ta eksperimentá un sintimentu di ta enamorá. Muzik ta zona mas dushi i ademas dor ku bo tin hopi energia, bo por keda baila pa oranan largu, manera ku den un *trans* bo ta.

Konsekuensia dor di uso di ecstasy

E dianan despues di uso, bo por haña sakamentu durante 2 dia. I dor ku hopi biaha ecstasy ta wòrdu usá den wikènt, e dia ku mas bo ta sinti malu ta riba djamars. E dia aki bo ta haña ademas síntomanan di depreshon.

Riesgonan fisiko dor di uso di ecstasy

E supstansia MDMA ta afektá e regulashon di temperatura den bo kurpa. Dor di ecstasy e temperatura di bo kurpa ta subi i bo ta kuminsá soda. Si banda di esei ta hasi kalor i bo ta bebe tiki awa, bo temperatura di kurpa ta subi dimás, bo ta pèrdè muchu vògt i bo kurpa ta seka. Tin hende ku dor di esaki no ta orina suficiente. Tin otro hende ku dor ku nan ta haña hopi set, nan ta bebe demasiado awa. E awa dimás ta intoksiká bo.

Ora bo usa ecstasy den un kantidat muchu haltu, bo ta haña doló di kabes hopi fuerte i bo ta maria. Tambe bo ta haña gana di saka, batimentu di kurason, preshon di sanger abou, keintura haltu i problemanan di koordinashon di moveshon. Tin hende ta haña un sintimentu ku e mundu no ta real. Tin kasonan ku uso di ecstasy a terminá na morto.

Riesgonan sikológiko dor di uso di ecstasy

Dor ku ecstasy ta un píldora, bo no sa sigur kiko presis bo ta guli. Si den píldora tin otro supstansianan straño, esakinan por kousa diferente efekto negativo. Tin biaha ta trata di supstansianan manera *speed*, kafeina òf supstansianan ku ta deprimí bo sistema nervioso.

Tur esakinan por kousa problemanan di memoria, problema pa konsentrá, depreshon i tambe e persona por hañ'é ku un bista trubel. Dor ku bo preshon di sanger ta subi, bo tin riesgo di haña un ataka selebral. Tin hende ku ta sinti nan mes un tiki malu, pero otro hende ta sinti nan mes iritá, ku doló di kabes, mariá, kansá i ku problema ku drumimentu.

Efektonan riba tèrmino largu

Hopi usadó di ecstasy ta bira depresivo segun tempu pasa. Nan ta haña un sintimentu di bashí, nan no ta mira e nifikashon di bida, nan ta sinti miedu i tambe nan por haña reakhonnan di pánico.

Hopi tin pensamentunan di paranoia i problema pa drumi. *Ecstasy* por dañá e nir i e igra. Usadónan di ecstasy ta haña grip i haña infekshon mas lihé.

Ecstasy i bo seleber

Ecstasy ta afektá e balansa di manera negativo di e sierto supstansianan den bo seleber. Un persona ku ta usa *ecstasy* un biaha pa luna òf mas frekvente, lo ripará ku e *kick* di *ecstasy* kada biaha ta bira ménos. Usa mas kantidat di *ecstasy* no lo yuda pa e efekto positivo oumentá.

Adikshon/Dependensia mental

Ecstasy por okashoná dependensia mental. Esaki ta sosodé na momento ku un persona no ta haña *leuk* mas pa sali sin usa *ecstasy*. E gana di usa ta asosiá ku e gana di sali, baila i tin kontakto ku otro hende. E gana aki por dura algun luna despues ku e persona a stòp di usa *ecstasy*. Un *trigger* por lanta e gana di usa *ecstasy* di nobo. Un *trigger* ta un lugá, un ambiente, un situashon òf un hende ku ta aktivá e gana di usa.

